



**R**eptiles se clasifican en lagartos (saurios), cocodrilos, serpientes (ofidios) y tortugas (quelonios). Esta clase de animales son los ancestros tanto de los mamíferos como de las aves.

Los reptiles surgieron de alguna clase de anfibios, pero se desconocen los detalles de sus comienzos. Los restos de los reptiles más primitivos conocidos han sido hallados a comienzos del Carbonífero Superior. Eran pequeños animales terrestres con un cierto parecido a los lagartos.

Poseen una piel gruesa protegida por una capa córnea protectora de escamas. Su reproducción es ovípara (mediante huevos). Su respiración es pulmonar durante toda su vida (incluido cuando son embriones). Esqueleto formado por 4

extremidades (tetrápodos), constituido por cráneo osificado y columna vertebral dividida en 5 regiones (cervical, torácica, lumbar, sacra y caudal), como los mamíferos.

Tienen independencia del medio acuático: adaptación total a la vida terrestre. Animales de sangres frías o poiquiloterms.

Se conocen aproximadamente unas 8000 especies de reptiles en todo el mundo.

La ciencia que se encarga de estudiar a estos animales (y a los anfibios) es la *herpetología*.

## **Tortuga mora** (*Testudo graeca*)



**Orden:** *Quelonia*                      **Familia:** *Testudinidae*

**Descripción:** Es fácilmente diferenciable de otros quelonios de la zona por su caparazón alto y abombado y por sus extremidades cortas, robustas, y sin adaptaciones para la natación. Su coloración es amarilla y negra. Es una especie herbívora. Pasa de los 40 años de vida.

Habita en el Sur y levante Peninsular pero con poblaciones muy localizadas.

Especie en peligro de *extinción* (*UICN Andalucía*).

## Galápago europeo (*Emys orbicularis*)



**Orden:** *Quelonia*

**Familia:** *Emyidae*

**Descripción:** Color pardo verdoso más o menos oscuro, con pintas o trazas amarillentas sobre la piel. Posee caparazón elevado para tratarse de un galápago. Sus poblaciones se encuentran en gran recesión por modificación de su hábitat y por la captura ilegal para uso doméstico.

Habita en toda la Península Ibérica pero con poblaciones muy localizadas.

Especie *vulnerable a la extinción (UICN Andalucía)*.

## **Galápago leproso** (*Mauremys leprosa*)



**Orden:** *Quelonia*

**Familia:** *Emydidae*

**Descripción:** Caparazón aplanado de color variable dentro de los tonos pardos o verdosos. El dibujo del cuello está formado por bandas estrechas anaranjadas o amarillentas. Se llama Galápago leproso por tener siempre pellejos colgando de las mudas.

Se distribuye por toda la Península Ibérica salvo zonas del Norte.

Especie *vulnerable a la extinción (UICN España)*.

## **Salamanquesa común** (*Tarentola mauritanica*)



**Orden:** *Squamata*

**Familia:** *Gekkonidae*

**Descripción:** Dorso del cuerpo y cola anillada con hileras de grandes tubérculos. Almohadillas adhesivas debajo de los dedos dispuestas en serie. Uñas sólo en el tercer y cuarto dedo. Pupila vertical. Puede llegar a los 15 cm de longitud.

Se distribuye por la mayor parte de la Península Ibérica excepto el Norte.

Especie de *preocupación menor* (UICN España).

## **Salamanquesa rosada** (*Hemidactylus turcicus*)



**Orden:** *Squamata*      **Familia:** *Gekkonidae*

**Descripción:** Alcanza los 12 cm. Posee un cuerpo deprimido y cabeza estrecha que le otorgan un aspecto esbelto, lo que la diferencia de la Salamanquesa común. Color rosado, piel rugosa, cola anillada de contraste claro y oscuro. Hábitos nocturnos. Se alimenta de insectos nocturnos y arácnidos.

Se distribuye principalmente por zonas costeras y valles. Especie de *preocupación menor* (UICN España).

**Lagartija colirroja**  
(*Acanthodactylus erythrurus*)



**Orden:** *Squamata*      **Familia:** *Lacertidae*

**Descripción:** Diseño dorsal típicamente rayado, con bandas claras y oscuras contrastadas en los juveniles y menos definidas en los adultos. Cola rojiza en los jóvenes y en las hembras en celo, ensanchada en su base en los machos.

Se distribuye por el Centro y Sur de la Península Ibérica, por las costas y grandes depresiones interiores. Endemismo Ibérico y Norteafricano.

Especie de *preocupación menor* (UICN España).

## **Lagartija ibérica** (*Podarcis hispánica*)



**Orden:** *Squamata*      **Familia:** *Lacertidae*

**Descripción:** Mide unos 6 cm de longitud. Cuerpo y cabeza aplanados, con escamas dorsales muy pequeñas de tonos pardos o verdosos con manchas oscuras, diseños casi lisos, formados por bandas longitudinales reticuladas. Tiene una banda lateral oscura, más o menos definida. Cola más larga que el cuerpo.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de *preocupación menor* (UICN España).

**Lagartija cenicienta**  
(*Psammodromus hispanicus*)



**Orden:** *Squamata*      **Familia:** *Lacertidae*

**Descripción:** Diseño muy parecido a la Lagartija colilarga, aunque presenta un moteado oscuro bien marcado en el dorso y cola. Presenta un diseño oliváceo, parduzco o grisáceo. También tiene tímpano oscuro en el cuello.

Se distribuye por casi toda la Península Ibérica.

Especie de preocupación menor (*UICN España*).

## **Lagartija colilarga occidental** (*Psammodromus algirus*)



**Orden:** *Squamata*      **Familia:** *Lacertidae*

**Descripción:** Parda u olivácea con dos bandas claras a cada lado. Puede llegar a medir hasta 30 cm de los que aproximadamente dos tercios, corresponden a su larga cola. Como otros muchos saurios puede desprenderse de su propia cola en caso de peligro. Tímpano negro. Se distribuye por la mayor parte occidental de la Península Ibérica.

Especie de *preocupación menor* (UICN España).

## Lagarto ocelado (*Lacerta lepida*)



**Orden:** *Squamata*

**Familia:** *Lacertidae*

**Descripción:** Lagarto robusto, generalmente muy vistoso y de gran tamaño. Puede alcanzar hasta los 70 cm de longitud total. Placa occipital muy ancha. Dorso recubierto de escamas amarillas y negras. Lo más llamativo son sus ocelos azules en el costado. Habita en zonas abiertas, con poca vegetación. Insectívoros principalmente.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de *preocupación menor* (UICN España).

## **Eslizón Ibérico** (*Chalcides bedriagai*)



**Orden:** *Squamata*

**Familia:** *Scincidae*

**Descripción:** Cuerpo muy brillante debido a sus escamas finas y uniformes. Extremidades reducidas. Dorso pardo, grisáceo o negro, a veces con dos bandas más claras que recorren la espalda. Alcanza unos 16 cm como máximo. Habita en zonas costeras, matorral mediterráneo, lugares pedregosos, etc. Come insectos. Se encuentra por toda la Península Ibérica excepto el Norte (endémica).

Especie *casi amenazada* (UICN España).

## **Culebrilla ciega** (*Blanus cinereus*)



**Orden:** *Squamata*      **Familia:** *Amphisbaenidae*

**Descripción:** Cuerpo anillado y sin extremidades, de color carnosos rosado, gris pardo o violáceo.

Reptil con apariencia exterior muy parecida a una lombriz, de la que se diferencia entre otras cosas por su tamaño, por tener pequeñas escamas y por sus diminutos ojos de escasa utilidad. Hábitos subterráneos.

Se distribuye por el Centro-Sur de la Península Ibérica.

Especie de *preocupación menor* (UICN España).

## **Culebra de herradura** (*Coluber hippocrepis*)



**Orden:** *Squamata*      **Familia:** *Colubridae*

**Descripción:** Culebra pequeña. Cabeza ligeramente deprimida, ovalada y bien diferenciada del cuerpo, que es largo y delgado al igual que la cola. El diseño corporal se caracteriza por una serie de manchas oscuras subcirculares en el dorso sobre un fondo pardo claro. Su nombre proviene de una mancha en forma de herradura en la cabeza.

Se distribuye por el Centro-Sur peninsular, y sobre todo por la Costa Mediterránea.

Especie de preocupación menor (*UICN España*).

## **Culebra lisa meridional** (*Coronella girondica*)



**Orden:** *Squamata*      **Familia:** *Colubridae*

**Descripción:** Pequeño tamaño, con dorso y flanco generalmente de color pardo o gris, con una hilera de manchas transversales en el dorso. En el vientre destacan unas manchas cuadradas oscuras en un diseño ajedrezado. En la parte dorsal de la cabeza hay una gran mancha en forma de “U”.

Se distribuye por toda la Península Ibérica excepto parte de la Cornisa Cantábrica y Pirineos.

Especie de preocupación menor (UICN España).

## **Culebra de escalera** (*Elaphe scalaris*)



**Orden:** *Squamata*

**Familia:** *Colubridae*

**Descripción:** Tiene una longitud media, ya que puede llegar a medir hasta 140 cm. Su hocico es puntiagudo, aunque lo más característico es su diseño dorsal, con dos bandas longitudinales oscuras sobre el fondo pardo en adultos y un diseño que recuerda a una escalera oscura sobre fondo grisáceo en juveniles.

Habita en toda la Península Ibérica salvo el límite Norte.  
Especie de *preocupación menor* (UICN España).

## **Culebra de cogulla occidental** (*Macroprotodon brevis*)



**Orden:** *Squamata*      **Familia:** *Colubridae*

**Descripción:** Es el ofidio más pequeño que habita en la Península Ibérica, de cola corta, cabeza pequeña y aplastada con antifaz en los ojos. En la parte posterior de la cabeza presenta un collar oscuro en la nuca y el diseño del cuerpo es grisáceo, moteado en negro.

Habita en el Sur de la Península Ibérica y Norte de África.

Especie *casi amenazada* (*UICN España*).

## **Culebra bastarda** (*Malpolon monspessulanus*)



**Orden:** *Squamata*

**Familia:** *Colubridae*

**Descripción:** Posee una depresión en la cabeza, debido al hundimiento de la escama frontal, lo que le otorga una mirada peculiar. El diseño es pardo y moteado en jóvenes y hembras y uniforme de color marrón y verdoso en machos adultos. Es venenosa, aunque no suele atacar a las personas.

Habita en toda la Península Ibérica salvo el límite Norte Atlántico.

Especie de *preocupación menor* (UICN España).

## **Culebra viperina** (*Natrix maura*)



**Orden:** *Squamata*

**Familia:** *Colubridae*

**Descripción:** Cabeza muy robusta en relación al cuerpo, en forma de punta de flecha. Dibujo dorsal oscuro en zigzag sobre fondo pardo u oliváceo. Vientre gris-amarillento con manchas oscuras con un diseño de ajedrez. Carece de veneno, aunque puede excretar un líquido maloliente.

Se distribuye por toda la Península Ibérica.

Especie de *preocupación menor* (UICN España).

## **Víbora hocicuda** (*Vipera lastatei*)



**Orden:** *Squamata*      **Familia:** *Viperidae*

**Descripción:** Cuerpo grueso y corto, cola pequeña, tamaño inferior a 60 cm, cabeza de aspecto triangular y bien diferenciada del cuerpo, con un apéndice nasal elevado hacia arriba. El diseño del cuerpo es el de una banda oscura en zig-zag sobre fondo ceniciento. Es muy venosa (mortal).

Se distribuye por la mayor parte de la Península Ibérica.  
Especie *vulnerable a la extinción (UICN Andalucía)*.