

Sinopteridaceae



Son Helechos terrestres, con rizoma erecto o rastrero, escamoso, raramente arborescente. Frondes pinnadas o deltoides, no articuladas al rizoma. Pecíolo oscuro y brillante. Su reproducción se realiza por medio de esporas.

- *Cheliantes tinaei* Tod.
- *Cosentinia vellea* (Aiton) Tod.

Sinopteridaceae



Nombre Científico *Cheilanthes tinaei* Tod.

Nombre Común Helecho

Ecología Planta rizomatosa con hojas de 8 a 22 cm de longitud. Hojas pequeñas en penachos, bi- o tripinnatisectas. Limbo con envés laxamente peloso-glanduloso. Esporas subesféricas, granuladas. Esporula de (octubre a noviembre) febrero a mayo. Esporádica. Rupícola acidófila.

Usos No se le conocen usos populares.

Sinopteridaceae



Nombre Científico *Cosentinia vellea* (Aiton) Tod.

Nombre Común Helecho

Ecología Planta rizomatosa con hojas de 5 a 35 cm de longitud. Rizoma corto. Pecíolo peloso, castaño. Limbo más largo que el pecíolo, bipinnatisecto. Esporas subtetraédricas. Esporula de febrero a mayo. Habita en muros y paredones soleados, preferentemente calcáreos.

Usos No se le conocen usos populares.