

## Linaceae



Son herbáceas o pequeñas matas anuales o bienales. Sus hojas son opuestas, alternas y sentadas. Inflorescencias cimosas. Flores actinomorfas y pentámeras, aunque rara vez puede aparecer tetrámeras. Fruto cápsula loculicida.

- *Linum bienne* Miller
- *Linum tenue* Desf. subsp. *tenue*
- *Linum strictum* L.



**Nombre Científico** *Linum bienne* Miller

**Nombre Común** Lino silvestre

**Ecología** Herbácea anual o bienal con tallos de hasta 50 cm erectos, estriados, glabros. Hojas lanceoladas o linear-lanceoladas, generalmente trinervadas, glabras. Inflorescencia en panícula laxa, de color malva. Fruto tipo cápsula globosa, apiculada. Florece de marzo a junio. Muy común en todo el territorio.

**Usos** No se le conocen usos populares.



**Nombre Científico** *Linum tenue* Desf. subsp. *tenue*

**Nombre Común**

**Ecología**

Herbácea anual con tallos de hasta 80 cm, erectos o ascendentes, glabros, estriados. Hojas linear-lanceoladas, uni o trinervadas, glabras, con márgenes algo recurvos. Inflorescencia en panícula muy laxa, con flores amarillas. Fruto tipo cápsula, globosa, apiculada. Florece de abril a agosto (noviembre). Habita en zonas ruderalizadas y en cultivos. Muy frecuente.

**Usos**

No se le conocen usos populares.

## Linaceae



**Nombre Científico** *Linum strictum* L.

**Nombre Común** Lino amarillo

**Ecología** Herbácea anual con tallos de hasta 40 (-70) cm, erectos, estriados, glabros o pubérulos en las partes más bajas. Hojas linear-lanceoladas o lanceoladas, uninervadas, con márgenes engrosados. Inflorescencia en panícula subcorimbosa o subspeciforme, con flores amarillas. Fruto tipo cápsula, globosa, apiculada. Florece de (marzo) abril a julio. Muy abundante en todo el territorio.

**Usos** No se le conocen usos populares.